

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP 20-4-67 638837

**BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES**

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

Tél. 88-30-34

88-06-15

ABONNEMENT ANNUEL

(MAINE & LOIRE, LOIRE ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDEE, DEUX-SÈVRES, VIENNE) MAYENNE Poste 571

15 F. 25 F.

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN N° 79 d'AVRIL 1967	- SARTHE - MAYENNE	P 19
SUPPLEMENT N° 1 AU BULLETIN " "	- MAINE-et-LOIRE - LOIRE-ATLANTIQUE - VIENNE - VENDEE	P 18
SUPPLEMENT N° 2 AU BULLETIN " "	- DEUX-SÈVRES Y COMPRIS LA REGION de la GATINE	P 21

AVERTISSEMENTS

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER - Les premières taches de la maladie sont apparues dans la Vallée de la Loire depuis le 10 avril. Les projections d'ascospores sont actuellement très nombreuses. Par ailleurs le relèvement de la température a provoqué un développement rapide de la végétation, feuilles en particulier. Le dernier traitement conseillé n'assure plus une projection suffisante, en conséquence effectuer une nouvelle pulvérisation dans les derniers jours de la semaine en cours. Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, ce traitement pourra être repoussé aux tout premiers jours de la semaine du 24 au 29 avril.

TAVELURE DU POMMIER - Aucune tache de la maladie n'a encore été découverte. Cependant le développement de la végétation est rapide et les germes dangereux sont nombreux. En conséquence, effectuer un traitement à la fin de la semaine en cours. Protéger soigneusement la Reinette du Mans qui arrive à un stade particulièrement sensible. Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, sur les variétés cultivées en forme basse, effectuer un nouveau traitement dans les tout premiers jours de la semaine du 24 au 29 avril. Sur la variété Reinette Clochard en forme haute tige, terminer d'urgence le traitement conseillé dans la note du 13 avril.

INFORMATIONS

OIDIUM DU POMMIER - Le relèvement de la température a provoqué le développement de nombreux germes dangereux ; en conséquence, profiter du traitement anti-tavelure pour lutter contre cette maladie sur les variétés sensibles.

PUCERONS - On note une recrudescence des pucerons sur différentes essences fruitières. Pour éviter leur pullulation, intervenir dès que possible.

PSYLLES - Des psylles apparaissent dans les vergers de poiriers ; en cas de nécessité, profiter du traitement anti-tavelure pour intervenir.

ARAIGNEE ROUGE - Le pourcentage des oeufs d'hiver éclos est peu important. Cependant, dans les vergers de poiriers et de pommiers fortement contaminés et n'ayant pas subi de traitement hivernal, la pullulation peut être déjà nuisible ; en conséquence, il y a lieu dans ces vergers d'intervenir dès maintenant. Dans la région de la Gâtine dans les Deux-Sèvres, attendre de nouvelles informations de la Station.

CHEMILLES DEFOLIATRICES - Se reporter aux notes antérieures.

MONILIA DU CERISIER - Continuer la protection.

PROTECTION DES ABEILLES - Se reporter aux notes antérieures.

L'Inspecteur de la Protection des
Végétaux :

J. DIXMERAS.

Les Contrôleurs chargés des Avertissements
Agricoles :

R. GEOFFRION - J. BOUCHET

TIRAGE DU 19 AVRIL 1967 - 2.910 EXEMPLAIRES.